



# NOVAGEN

PHARMA

## PROFESSIONELE INLIJSTING

### SKEDULERINGSTATUS

54

### 1. NAAM VAN DIE MEDISYNE

NOVAGEN (50 mg filmbedekte tablet)

### 2. KWALITATIEWE EN KWANTitatiewe SAMESTELLING

Eike filmbedekte tablet bevat natriumvalproaat, gelijkstaande aan 50 mg dolutegravir.

In die tablette word 50 mg valproaat en 144,4 mg maltol.

Vir 'n volledige lys van hulstypologies, sien afdeling 5.1.

### 3. FARMACEUTISCHE VORM

#### Tablette

NOVAGEN.

Roodbruin, ronde, likoskone, filmbedekte tablette, aan die een kant gedruk met "T over 50", en gewoon aan die ander kant.

### 4. KLINISCHE BESONDERHEDDE

#### 4.1 Terapeutiese toepassing

NOVAGEN word alleen gebruik vir die behandeling van menslike immunetebegryfsirus (MIV) infeksie in kombinasie met ander antiretroviale middels by volwassenes van 16 jaar en ouer.

#### 4.2 Posologie en metode van toedeling

NOVAGEN moet begin word deur 'n mediese praktyk wat ewaring het met die hantering van MIV-infeksie.

#### Posologie

##### Volwassenes

Behandlingsplanne:

Vir pasiënte wie tydens die eerste antiretroviale terapie (behandlingsnaalwe) begin, is die aanbevolle dosis NOVAGEN 50 mg een keer per dag.

Behandlingsnaalwe, en integrase-inhibeerder-naalwe:

Vir pasiënte wat nie nog voorheen met 'n integrase-inhibeerder behandel is nie, is die aanbevolle dosis NOVAGEN 50 mg een keer per dag.

Integrase-inhibeerder-naalwe:

Vir pasiënte wat nie eerder integrase-inhibeerder was, is die aanbevolle dosis NOVAGEN 50 mg twee keer per dag.

Rifampicin verlaag die toedeling van dolutegravir. Aanvullende dosis dolutegravir moet gegegee word aan pasiënte wat rifampicin neem.

Dus is bewyse dat die konseptuele ionasional verlooging vir die behandeling van MIV-infeksie.

#### Besjeders

Die aanbevolle dosis NOVAGEN is nodig by pasiënte met lige hepatiese inkorting (Child-Pugh-grade A of B) nie. NOVAGEN is teenaangeend by pasiënte met grade of ernste hepatiese inkorting (sien afdeling 4.3).

#### Pediatriese Populasie

Die veiligheid en doeltreffendheid van NOVAGEN by kinders onder 18 jaar is nie vasgestel nie.

#### Methode van toedeling

NOVAGEN kan met sonder voedeel word.

NOVAGEN kan met sonder voedeel klarewassend, met NOVAGEN verkleistik saam met voedeel geneem word op bosteling vir verhoog (veral by pasiënte met sonder voedeel).

#### 4.3 Kontraindikasies

NOVAGEN is tenuitgestel vir:

• pasiënte wat bekend is vir die behandeling van dolutegravir of vir een van die hulstope.

• kombinasie met dolutegravir en pipecidien (sien afdeling 4.5).

• pasiënte met ernste hepatiese inkorting (Child-Pugh-grade C) nie.

• vroue van bewegend ouderdom wat nie op effektiewe voorbehoedmiddels is nie.

Metformin is teenaangeend by pasiënte wat NOVAGEN neem.

#### 4.4 Speciale waarskuings en voorwaarsomtreksels vir gebruik

Integrase-klaarstand van besondere belang:

Vir pasiënte wat NOVAGEN in die tweede week van 'n integrase-klaarstand begin gebruik, moet daar in ag geneem word dat die werkung van NOVAGEN nie so vinnig sou begin nie. Die werkung van NOVAGEN moet in die tweede week van 'n integrase-klaarstand begin gebruik, en dan moet NOVAGEN 50 mg twee keer per dag toedeling vir die kombinasie van rifampicin en NOVAGEN begin gebruik.

#### Hipersensitiviteitsverlaakse

Geen hypersensitiviteitsverlaakse genereer nie.

Geen hypersensitiviteitsverlaakse genereer nie.